

जरे समूहका तरकारीको उन्नत खेती तथा बीउ उत्पादन प्रविधि

तारी सिंह ठकुराठी
अधिकृत छैटौ

परिचय :-

जरे तरकारी वाली अन्तर्गत मुला, सलगम, गाजर र चुकन्दर पर्दछन् भने अरु तरकारीको रुपमा प्रयोगमा ल्याईने तरुल, पिंडालु र सखरखण्डहरु पनि जरे वाली अन्तर्गत लिन सकिन्छ। हाम्रो देशमा जरे तरकारी वालीहरु मध्ये सर्व प्रथम मुला तरकारीले पहिलो स्थान ओगटेको छ। यसै गरी दोश्रो स्थानमा सलगम, गाजर र अन्य वालीहरु पर्दछन्।

१. मुला खेती :-

अंग्रेजीमा मुलालाई ज्याडिस भनिन्छ। नेपालमा मुला निकै प्रचलित तरकारी वालीको रुपमा लिईने गरिन्छ। यसलाई खेत वारीमा एकल वालीका रुपमा लगाउनुको साथै अरु वाली संग मिसाएर वा छेउ छाउको ड्याङ्गमा लगाईन्छ। पोषण तत्वको दृष्टीकोणले यसको पातमा भिटामिन ए पाईन्छ। त्यसै गरी केही अंशमा भनेपनि प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाईड्रेट, क्याल्सियम, फस्फोरस, आर्इरन आदी पोषम तत्व पनि पाईन्छ। यसले हाम्रो शरिरको पाचन क्रियामा मद्दत गर्दछ। मुलाको प्रयोग कांचै वा अन्य तरकारीमा मिसाई पकाएर वा अचार बनाई वा सिन्की बनाएर खाने प्रचलन छ। हालको अवस्थामा नेपालमा बिक्री हुने तरकारीहरुको बीउ मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्थान मुलाको बीउले ओगटेको छ।

जातहरु :- (क) मिनुअर्लि:- यो जात नेपालमा ज्यादै प्रचलित भै सकेको छ। यसको जरा सेतो, सरदर ४० से.मी लामो र करिब ८ से.मी गोलाईको हुन्छ। बीउ छरेको सरदर ४०-५० दिन पश्चात जरा खाने लायकका हुन्छन्। यो जातको स्वाद गुलियो गुलियो हुन्छ।

(ख) चालीस दिने:- यो मुला गर्मी याममा लगाउनु हुने र चाँडो जरा तयार हुने भएकोले निकै प्रचलित भै सकेको छ। यसको लम्बाई करिब १५ से.मी लामो हुन्छ। बीउ छरेको ३०/४० दिनमा जरा खाने लायकका हुन्छन्।

(ग) प्युठाने रातो:- यो नेपालको स्थानिय जातको मुला हो। माटो माथीको जरा रातो रङ्गको हुन्छ र माटो मुनिको भाग पिकका रातो हुन्छ। पातका नशाहरु पनि रातो नै हुन्छ। यो जातको मुला ढिलो तयार हुन्छ। जराको लम्बाई ४० से.मी लामो सम्म हुन्छ।

(घ) टोकिनासी:- यो धेरै ढिलो तयार हुने जात हो। यसले ठण्डी सहन सक्दछ, त्यसैले यस जातको खेती मंसिर, पौष महिनामा गरिन्छ। बीउ छरेको ४०/५५ दिनमा वाली तयार हुन्छ। यसको पात गाढा हरियो तथा खस्रो अनि ठाडो हुन्छ। यसको लम्बाई ३०-४० से.मी हुन्छ।

अन्य जातहरुमा हवाईट नेक, हवाईटलङ्ग र चेतकी आदी पनि नेपालमा खेती गरेको पाईन्छ। हवाईट नेक ६०-६५ दिन, हवाईटलङ्ग ६०-६५ दिन, चेतकी ४०-४५ दिन लाग्छ।

यी जातहरु मध्ये मिनुअर्लि, व्हाईटनेक, प्युठाने रातो नेपालको मध्ये पहाडमा सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ भने टोकिनासी मुलाको लागी उच्च पहाड याने २००० मीटर भन्दा माथी राम्रो मानिन्छ।

हावापानी :- मुला खेती साधारण तथा हिउंद महिनामा गरिन्छ। त्यसैले यसको खेती चिसो हावापानीमा राम्रो हुन्छ। गर्मी महिनामा विशेष गरी तापक्रमको कारण मुला कडा हुने, पिरो हुने र चाडै नै डुकु पलाउने हुन्छ। यस खेतीको लागी १८-२४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम उत्तम मानिन्छ। माटोको चिस्यान ६०-७० प्रतिशत भै रह्यो भने खेती राम्ररी सप्रन्छ।

माटो :- मुला खेती सबै किसिमको माटोमा गर्न सकिने भएता पनि हल्का बुरबुराउँदो दोमट देखि बलौटे प्राङ्गारिक मल बढी भएको ठाउँमा मुलाको उत्पादन राम्रो हुने गर्दछ।

जमिनको तयारी :- जमिन ३-४ पटक खनजोत गरी राम्ररी डल्ला फोर्नु पर्दछ। त्यसपछि मात्र ड्याङ्ग बनाउने वा सम्याउने काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

मलखाद :- राम्ररी सडेको (कुहिएको) मल १००० के.जी. प्रति रोपनी अथवा ४० डोको प्रति रोपनी जमिन तयार गर्दा हाल्नु पर्दछ। नसेडेको कम्पोष्ट मल हाल्नु हुँदैन किन भने यसले गर्दा कापे जरा वृद्धि गर्नमा बढावा दिन्छ। कम्पोष्ट मलको साथ साथै रसायनिक मलको पनि व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा राम्रो उत्पादन लिनमा सक्षम भईन्छ। रसायनिक मलको हकमा ३ के.जी. नाईट्रोजन, २ के.जी. फस्फोरस, र २ के.जी. पोटास प्रति रोपनीका दरले प्रयोग गर्नु पर्दछ। रसायनिक मल प्रयोग गर्दा तोकिएको फस्फोरस र पोटास तत्व जमिन तयारी गर्दा हाल्नु पर्दछ र नाईट्रोजनको हकमा २ के.जी. र बाँकी एक किलो वाली लगाएको भण्डै एक महिना पछि

(साईड ड्रेसिङ्ग) बोटको चारै तिर तर जरा भन्दा अलि पर हाल्नु पर्दछ।

वाली लगाउने समय:- नेपालमा मुला खेती लेक, पहाड र तराईका विभिन्न स्थानहरुमा बेग्ला बेग्लै समयमा गरिन्छ।

मिनोअर्लि मुलाको हकमा लेकाली भेगमा बैशाख देखि श्रावण सम्ममा रोपी भदौ अशोजमा तयार हुन्छ। उच्च पहाडमा जेष्ठ-श्रावण महिनामा वा भाद्र महिनाको १५ सम्ममा लगाई सक्नु पर्ने हुन्छ। मुलाको उत्पादन आषाढ-अशोजमा हुन जान्छ। मध्ये पहाडको हकमा भाद्र १५ देखि अशोज १५ सम्म लगाउनु पर्दछ र मंसिर-माघमा वाली तयार हुन जान्छ। तर बीउ बाट बीउ उत्पादन गर्ने हो भने कार्तिक महिनामा लगाउनु पर्दछ। तराई क्षेत्रको लागी हो भने भदौ अशोजमा बीउ रोपी मंसिर-माघमा वाली तयार हुन्छ।

चालिस दिने मुलाको हकमा उच्च पहाडमा जेष्ठ-श्रावणमा बीउ रोपी आपाढ-अशोजमा बाली तयार हुन्छ । मध्ये पहाडी भेगमा फाल्गुण चैत्रमा बीउ रोपी वैशाख-आषाढमा बाली तयार हुन्छ । त्यसै गरी तराई क्षेत्रको लागी माघ-फाल्गुणमा बीउ रोपेर फाल्गुण-वैशाख महिनामा बाली लिने काम हुन्छ ।

प्यूठाने रातोको हकमा उच्च पहाडमा वैशाख-श्रावणमा बीउ रोपी आपाढ-अशोजमा बाली लिईन्छ। मध्ये पहाडमा भाद्र-अशोजमा बीउ रोपी मंसिर-माघमा बाली तयार हुन्छ ।

त्यसै गरी तराईमा भाद्र-अशोजमा बीउ रोपी मंसिर-माघमा बाली लिने काम हुन्छ ।

टोकीनासी मुलाको लागी उच्च पहाडमा भाद्र-कार्तिकमा बीउ रोपी अशोज-मंसिरमा बाली लिईन्छ । मध्ये पहाडको लागी भाद्र-माघमा बीउ रोपी कार्तिक-चैत्रमा बाली लिईन्छ र तराईको लागी हो भने अशोज-माघ महिनामा बीउ रोपी कार्तिक-चैत्र महिनामा बाली लिने काम हुन्छ ।

बीउ रोप्ने दुरी :- १-१.५ फिटको फरकमा ४-५ इन्च माटो उठ्ने गरी ड्याङ्ग बनाउने । ९-१० इन्चको फरकमा एक डोबमा २-३ दाना मुलाको बीउ खसाल्नु पर्दछ । त्यस पछि जब मुला २-३ पाते हुन्छ , त्यति बेला एक डोबमा एक बोटमात्र रहने गरी उखेली तरकारी खान सकिन्छ ।

जरा लगाउने विधि:- तयार भएको जरालाई एक लहर देखि अर्को लहर सम्म ६० से.मी र एक बोट देखि अर्को बोटको दुरी ३० से.मी फरक गरी लगाउनु पर्दछ । जरा सार्दा पातको डाँठ ६ से.मी जती राखेर सबै पात काट्नु पर्दछ ।

पृथकता दुरी:- मुल बीउ उत्पादनको लागी १६०० मीटर र उन्नत बीउ उत्पादनको लागी १००० मीटरको दुरी हुन जरुरी हुन्छ ।

सिंचाई :- बाली अवधि भरमा कति पटक पानी दिने भन्ने सन्दर्भमा मौसम, माटोको किसिम, माटेमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा र बालीको उमेरमा भर पर्दछ । जे होस् माटो सुख्खा भयो भने मुला कडा र पिरो तथा खस्रो भई आकर्षित हुँदैन । त्यसैले माटोमा चिस्यानको मात्रा भई रहनु जरुरी हुन्छ ।

गोडमेल :- भारपात उम्रन र बढ्न दिनु हुँदैन । मुला खेतीमा कम्तिमा पनि २ पटक गोडमेल गर्दा राम्रो हुन्छ । यदि भार उम्रन नदिने र रसायनिक औषधीको प्रयोग गर्ने हो भने वेसालिन भन्ने भार नियन्त्रक औषधी मुला रोप्ने भन्दा अगावै खनजोत गरी माटोमा १ किलो प्रति रोपनी हाल्नाले भार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ ।

बीउ दर :- ३००-५०० ग्राम प्रति रोपनी प्रयाप्त हुन्छ ।

उत्पादन :-

एक रोपनी क्षेत्रफलको बाट ताजा तरकारीको रूपमा १०००-२५०० के.जी सम्म मुलाको जात हेरी उत्पादन हुन सक्दछ भने बीउ उत्पादनको लागी विभिन्न जात अनुसार फरक फरक हुन्छ । बीउ उत्पादन:- उच्च पहाडी भेगमा सरदर २५ के.जी प्रति रोपनी

मध्ये पहाडी भेगमा सरदर ३५-५० के.जी	„
तराई भेगमा सरदर ३५ के.जी	„

२. गाजर खेती :-

अंग्रेजीमा यसलाई क्यारोट भनिन्छ । गाजरमा क्यारोट (भिटामिन ए.) बढी हुने भएकोले गत केही दशक नेपालमा गाजर खेती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।

हावापानी :- जरा हुर्किन तापक्रमको आवश्यकताको आधारमा गाजरका जातहरु दुवै बर्गमा विभाजित गरिन्छ ।

(अ) उष्ण प्रदेशिय एसियाली जात

(आ) शितोष्ण प्रदेशिय अथवा यूरोपेली जात

उष्ण प्रदेशिय जातलाई जराको विकास हुन शितोष्ण प्रदेशिय जातलाई भन्दा बढी तापक्रम चाहिन्छ । जराको राम्ररी विकास हुन १८-२० डि.से. तापक्रम उचित हुन्छ । उच्च तापक्रममा जराको रंग जमिन माथि हरियो र जमिन मुनी सेतो हुन्छ । जसले भिटामिन ए को कमी भएको जनाउँछ ।

लगाउने दुरी :- एक लाईन देखि अर्को लाईनको दुरी ९-१० इन्च, एक बोट देखि अर्को बोटको दुरी ३-५ इन्च हुन उपयुक्त हुन्छ ।

पृथकता दुरी:- मुलाको जस्तै हुनु पर्दछ ।

लगाउने समय :- बीउको लागी लगाउदा चैत्र देखि आषाढ सम्म अर्थात श्रावणको १५ सम्ममा लगाई सक्नु पर्दछ र मंसिर महिनामा जरा उखेली सार्नु पर्दछ । ताजा तरकारीको लागी भने मध्ये पहाडमा भाद्र -असोज महिनामा

बीउ दर :- २०० ग्राम प्रति रोपनी

जातहरु :- न्यूकोरोडा र नान्डीस फोटो

उत्पादन :- ६००-७०० के.जी. प्रति रोपनी ताजा तरकारीको उत्पादन हुन्छ भने बीउको हकमा २५-३० के.जी प्रति रोपनी हुन सक्दछ ।

३. सलगम खेती :- अंग्रेजीमा टर्निप भनिन्छ ।

जमिनको तयारी :- मलखाद, सिंचाई, गोडमेल आदी मुलाको जस्तै गर्नु पर्दछ ।

बीउ दर :- २०० ग्राम प्रति रोपनी प्रयाप्त हुन्छ ।

लगाउने दुरी :- एक लाईन देखि अर्को लाईनको दुरी ९ ईन्च देखि १ फिट र एक बोट देखि अर्को बोटको दुरी ७-८ ईन्च उपयुक्त हुन्छ ।

लगाउने समय :- मध्ये पहाडमा भाद्र - असोज महिनामा ।

उत्पादन :- ७००-१५०० के.जी. प्रति रोपनी ताजा तरकारी र ४० के.जी सम्म बीउ उत्पादन हुन सक्दछ ।

४. चुकन्दर खेती :-

अंग्रेजीमा बीट भनिन्छ । यो काँचै सलगमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । अमेरिका र यूरोप देशमा विशेष गरी पशुहरुलाई खुवाउन प्रयोग गरिन्छ । यो खेतीले चिसो मौसम रुचाउँछ ।

जातहरु: डेड्रोइट डार्क रेड र अर्ल ब्लड टर्निप ।

बीउ दर :- ५० ग्राम प्रति रोपनी ।

लगाउने दुरी :- एक लाईन देखि अर्को लाईनको दुरी ८-९ ईन्च देखि १ फिट र एक बोट देखि अर्को **बोटको दुरी :-** ३-५ ईन्च उपयुक्त हुन्छ ।

लगाउने समय :- मध्ये पहाडमा भाद्र - असोज महिनामा ।

उत्पादन :- १०००-१२०० के.जी. प्रति रोपनी, बीउ उत्पादन ५० के.जी प्रति रोपनी ।